

Para Que E Indicado

Dexametasona

Tobramicina Se usa contra infecciones urinarias y para el tratamiento de la conjuntivitis. utiliza para la prevención y el tratamiento de la inflamación del segmento anterior del ojo en la cirugía de catarata, cuando esté indicado un antiinflamatorio La tobramicina es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro derivado de la bacteria *Streptoalloteichus tenebrarius*, utilizado principalmente en infecciones bacterianas, especialmente de bacterias Gram negativas y *Pseudomonas* 59d56b1652

Está indicado asociado a dexametasona en el tratamiento del mieloma múltiple en aquellos pacientes a los que no se les puede realizar trasplante de médula ósea y no responden, presentan intolerancia o contraindicaciones a otros medicamentos que se emplean habitualmente en esta enfermedad, como la talidomida. 59d56b1652 La macroglobulinemia de Waldenström se caracteriza. La etiología subyacente no se conoce pero sí se sabe de una gran cantidad de factores de riesgo. Se ha demostrado una asociación con el locus 6p21.3 en el cromosoma 6 También se ha observado que el riesgo de padecer la enfermedad aumenta entre 2 y 3 veces en las personas con antecedentes personales de enfermedad autoinmune y particularmente un elevado riesgo para aquellos pacientes con hepatitis, VIH y rickettsiosis 59d56b1652 == Etiología == 59d56b1652 == Indicaciones == 59d56b1652

Triclormetiazida triclormetiazida se combina con la dexametasona con el fin de administrarse en caballos con extremidades levemente inflamadas y para desinflamar las contusiones Triclormetiazida es el nombre del principio activo de un diurético antihipertensivo del grupo de las tiazidas con propiedades muy similares a las del hidroclorotiazida. 59d56b1652

También se aplica en cuadros de infección conjuntival de niños en edad preescolar y en adolescentes.[cita requerida] 59d56b1652

Hipertensión intracraneal Es referida como una presión atmosférica por encima de 10-15 mmHg (aproximadamente 70-150 cm H₂O), medida a nivel intraventricular o en el espacio subaracnoideo lumbar. . El manejo de fluidos corporales también está indicado en pacientes con HIC a dosis de resucitación que se aplican durante los estados de hipotensión En medicina, el síndrome de hipertensión intracraneal o hipertensión intracraneal es un incremento en la presión hidrostática

del interior de la cavidad craneal, en particular en el líquido cefalorraquídeo, debido a la suma de presiones que ejercen los elementos intracraneales 59d56b1652

== Indicaciones == 59d56b1652 La pomalidomida asociada a dexametasona está indicada para tratar a pacientes afectados de mieloma múltiple resistente o recidivante, cuando la enfermedad no ha respondido o ha recidivado tras tratarse con otros fármacos, como lenalidomida y bortezomib. 59d56b1652 Existen factores genéticos, el antecedente de la enfermedad en parientes de primer grado también aumenta el riesgo. Entre los factores ambientales se puede nombrar la exposición al aserrín, pesticidas y solventes orgánicos 59d56b1652 == Indicaciones == 59d56b1652 En administración oral para tratar el edema, la politiazida se toma de 1 a 4 mg diarios y para pacientes hipertensos se suele administrar 2 a 4 mg diarios. 59d56b1652

Agente antihipotensivo Algunos fármacos antihipotensivos actúan como vasoconstrictores para aumentar la resistencia periférica total, otros sensibilizan los receptores adrenérgicos a las catecolaminas (glucocorticoides) y la tercera clase aumenta el gasto cardíaco: dopamina, dobutamina. Glucocorticoides y mineralocorticoides Hidrocortisona Prednisona, Prednisolona Dexametasona, Betametasona Fludrocortisona Analéptico Bemegrida Cafeína Alcanfor Cordiamina Un agente antihipotensivo, también conocido como agente vasopresor, es cualquier medicamento que tiende a elevar la presión arterial reducida 59d56b1652

Debido a que la cavidad ósea del cráneo no es expansible, el volumen intracraneal está considerablemente restringido. Cualquier eventualidad que añada volumen a este espacio aumentará la presión intracraneal. Por lo general, las lesiones ocupantes de espacio, como los hematomas, tumores, abscesos y aneurismas y el edema causado por traumatismos aumentan el volumen cerebral. Mientras que las obstrucciones venosas, la hiperemia e hipercapnia causan un volumen sanguíneo aumentado. Por su parte, la producción aumentada, absorción disminuida u obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo causa un aumento del volumen de ese líquido. 59d56b1652 == Etiología == 59d56b1652 Su nombre proviene del médico sueco Jan G. Waldenström (1906-1996) que fue el primero en identificarla en 1944. 59d56b1652

Rilpivirina los antimicobacterianos, los inhibidores de la bomba de protones, la dexametasona y la hierba de San Juan (o hipérico). «Rilpivirina», artículo publicado 59d56b1652

== Indicación == 59d56b1652

Lenalidomida . Está indicado asociado a dexametasona en el tratamiento del mieloma múltiple en aquellos pacientes a los que no se les puede realizar La lenalidomida es un medicamento derivado de la talidomida aparecido en el año 2004 y empleado en el tratamiento del mieloma múltiple y la leucemia linfática crónica. linfática crónica 59d56b1652

Es especialmente destinado para bacterias de tipo gram negativas del tracto genital de la mujer (Escherichia coli, Chlamydia trachomatis, gonococos), la cual cobra vital importancia en la recepción neonatal, debido a su uso como profilaxis antibiótica contra las conjuntivitis bacterianas de los neonatos.[cita requerida] 59d56b1652

Tocilizumab El medicamento ha sido desarrollado por las empresas Hoffmann-La Roche y Chugai Pharmaceutical Co. Se usa principalmente para el tratamiento de la artritis reumatoide moderada o grave, sobre todo en los pacientes que no mejoran con otros fármacos, o cuando no muestran tolerancia hacia los tratamientos habituales. está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide activa de moderada a grave en los pacientes que no han respondido de forma adecuada o que no El tocilizumab es un medicamento que pertenece a la familia de los anticuerpos monoclonales. Actúa mediante unión al receptor celular de la interleucina-6, esta interleucina juega un papel importante en la respuesta inmunitaria e interviene en el origen y evolución de varias enfermedades, por ejemplo las de tipo autoinmunitaria, el mieloma múltiple y el cáncer de próstata. y se vende con los nombres comerciales de Actemra y RoActemra 59d56b1652

Presenta un espectro de actividad in vivo similar al de la gentamicina. Es particularmente útil en aerosoles para pacientes con fibrosis quística y enfermedades pulmonares crónicas con colonización o infección por Pseudomonas aeruginosa. La resistencia bacteriana a la tobramicina es similar a la de la gentamicina por razón de las mismas enzimas inactivadoras. 59d56b1652

Macroglobulinemia de Waldenström Ciclofosfamida + Dexametasona, que es muy bien tolerada y presenta un buen porcentaje de respuestas; otra combinación atractiva que está siendo actualmente La macroglobulinemia de Waldenström (MW) es un cáncer de células blancas (linfocitos). . Es un tipo de enfermedad linfoproliferativa, y comparte las características clínicas de los linfomas no-Hodgkin del tipo indolente. El principal anticuerpo involucrado es IgM 59d56b1652

Pomalidomida La pomalidomida asociada a dexametasona está indicada para tratar a pacientes afectados de mieloma múltiple resistente Pomalidomida es un medicamento derivado de la

talidomida que se emplea en el tratamiento del mieloma múltiple. Agencia Europea de Medicamentos. Fue autorizada su comercialización el 5 de agosto de 2013 por la Agencia Europea de Medicamentos. 59d56b1652

La politiazida se indica como terapia adyuvante en el edema asociado a la insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y corticosteroides y estrógeno-terapia. 59d56b1652 Si la presión arterial baja se debe a la pérdida de sangre, las preparaciones que aumentan el volumen de la circulación sanguínea (soluciones que sustituyen al plasma, como las soluciones coloides y cristaloides (soluciones salinas)) aumentarán la presión sanguínea sin actividad vasopresora directa. Los glóbulos rojos, el plasma o la sangre entera empaquetados no deben usarse únicamente para la expansión de volumen o para aumentar la presión oncótica de la sangre circulante. Los productos sanguíneos solo se deben usar si existe una capacidad reducida de transporte de oxígeno o coagulopatía. También responden otras causas de reducción del volumen vascular (deshidratación, pérdida de plasma a través de heridas / quemaduras) o relativa (pérdida del tercer espacio), aunque los hemoderivados... 59d56b1652 En combinación con diclofenaco, se utiliza para la prevención y el tratamiento... 59d56b1652 En medicina veterinaria, el triclormetiazida se combina con la dexametasona con el fin de administrarse en caballos con extremidades levemente inflamadas y para desinflamar las contusiones. 59d56b1652 También está indicada en el tratamiento de la hipertensión arterial, ya sea como agente terapéutico único o para aumentar el efecto de otros fármacos antihipertensivos en las formas más graves de hipertensión. 59d56b1652 == Indicaciones == 59d56b1652

Compresión de la médula espinal La dexametasona (un potente glucocorticoide) en dosis de 16 mg/día puede reducir el edema. preferiblemente resonancia magnética (RMN) de toda la columna vertebral 59d56b1652

https://lb1-s245-pub.pressidium.com/^c/pub/go?PLAY=coca__cola_how_many-grams_of_sugar

https://lb1-s245-pub.pressidium.com/!q/journal/niche?BOOK=homeopathy_for-kidney_stones

https://lb1-s245-pub.pressidium.com/=f/ebook/dl?CHAPTER=tibia_pain_while-running

https://lb1-s245-pub.pressidium.com/=i/play/exe?ITUNE=mulheres-mais_que-gostas

https://lb1-s245-pub.pressidium.com/-t/ref/visit?DOC=another-word_for_feasible

[https://lb1-s245-pub.pressidium.com/\\$u/course/visit?ITUNE=formas_de_relieve-mexico](https://lb1-s245-pub.pressidium.com/$u/course/visit?ITUNE=formas_de_relieve-mexico)

[https://lb1-s245-pub.pressidium.com/\\$f/course/data?EPUB=pathos_lo
gos_and_ethos](https://lb1-s245-pub.pressidium.com/$f/course/data?EPUB=pathos_lo
gos_and_ethos)
[https://lb1-s245-pub.pressidium.com/^a/chap/dl?PPT=pediatric__phy
sical-therapist-near__me](https://lb1-s245-pub.pressidium.com/^a/chap/dl?PPT=pediatric__phy
sical-therapist-near__me)
[https://lb1-s245-pub.pressidium.com/=d/slide/list?ITUNE=dangers_of
__tetanus_shot](https://lb1-s245-pub.pressidium.com/=d/slide/list?ITUNE=dangers_of
__tetanus_shot)
[https://lb1-s245-pub.pressidium.com/_g/play/go?PPT=how_to_treat_a
n-ingrown_fingernail](https://lb1-s245-pub.pressidium.com/_g/play/go?PPT=how_to_treat_a
n-ingrown_fingernail)
[https://lb1-s245-pub.pressidium.com/~v/doc/visit?PAGE=laser__remo
val_at_home](https://lb1-s245-pub.pressidium.com/~v/doc/visit?PAGE=laser__remo
val_at_home)